

LES EFFETS INDÉSIRABLES DE LA VACCINATION COVID-19



**Une synthèse basée sur les données
de pharmacovigilance mondiales**



ADRreports




Yellowcard scheme



Swissmedic

NOVEMBRE 2021



Réinfo **Santé**
Suisse International

www.reinfosante.ch

LES EFFETS INDÉSIRABLES DE LA VACCINATION COVID-19

Jamais, un tel déluge d'effets indésirables graves et de décès en si peu de temps...



ADRreports



Yellowcard scheme



Swissmedic

20 NOVEMBRE 2021

LES EFFETS INDÉSIRABLES DE LA VACCINATION COVID-19

L'analyse des données européennes¹ met en évidence des effets indésirables qui entraînent des risques spécifiques dont le public n'est pas informé. **Le consentement ne peut pas être considéré comme éclairé !**



Troubles de la coagulation : modification des cellules sanguines (55 298), hémorragies/hématomes graves (11 681), thromboses/embolies graves (34 731), rupture/anévrisme (3 746).

Troubles neuro/psychologiques : douleurs sévères invalidantes (75 756) épilepsies/convulsions graves (7502), dépression sévères/suicides (3 241), narcolepsie (92).

Troubles du fonction cardiaque (70 138), arrêt cardiaque (5 281).

Perte ou diminution de l'audition (4 846), de la vue (3 463).

Paralysies diverses (5 739), tremblements graves (12 195), attaques cérébrales (2 604).

Infections graves : COVID (25 262), péricardites/myocardites (10 637) zona (8 070), encéphalite/méningite (914).

Maladies auto-immunes : asthme (2 750), diabète (1 124), maladie de Crohn (281), lupus (357), fibromyalgia (621), syndrome Guillain Barré (2 487).

Problèmes sur l'appareil reproducteur : avortement (1 980), accouchements prématurés (302), troubles menstruels graves (14 634), ménopauses précoces (1 957), troubles érection/ejaculation (412)

Problème grave de peaux : 66 141



Thrombose

Les derniers chiffres du 04.11.2021

1. Pour l'ensemble des vaccins utilisés dans l'UE

LES EFFETS INDÉSIRABLES DE LA VACCINATION COVID-19

RESUMÉ

- Fait #1** Il n'y a jamais eu un tel déluge d'effets indésirables graves en si peu de temps !
- Fait #2** Les données publiées sont tronquées, non fiables, et non transparentes.
- Fait #3** Les risques de la vaccination l'emportent sur les risques de COVID grave.
- Fait #4** Les vaccins sont encore en essais cliniques phase 3, avec résultats prévus en 2022/2023.
- Fait #5** Swissmedic estime que seul 10% d'effets indésirables des vaccins sont annoncés !
- Fait #6** Le COVID-19 est une maladie à faible mortalité qui ne nécessite pas le recours à des thérapies expérimentales.
- Fait #7** La fréquence des nombreux effets indésirables observés par Pfizer-BioNTech.



LES EFFETS INDÉSIRABLES DE LA VACCINATION COVID-19

FAIT #1 Il n'y a jamais eu un tel déluge
d'effets indésirables graves
en si peu de temps* !



* 10 mois

Dépassement de tout ce qui a pu être observé **avec tous les autres médicaments** et en dépit des nombreux scandales
ex : Médiator = 1500 à 2500 morts sur 10 ans en France



Au 30 octobre 2021, **les chiffres européens** pour
les vaccins *Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, J&J*

299 515 987 personnes vaccinées¹
3 033 155 effets déclarés concernant
1 115 895 personnes dont 43% EI graves !
et 16 671 personnes sont décédées !

809 322 ont abouti à des séquelles dont
27 728 sont irréversibles !

1 105 853 n'ont pas d'évolution connue
des autorités !

www.adrreports.eu/fr

1. Personnes vaccinées (18+) avec au moins une dose au 8 novembre 2021 selon le European Centre for Disease Prevention and Control

LES EFFETS INDÉSIRABLES DE LA VACCINATION COVID-19

FAIT #1 Il n'y a jamais eu un tel déluge d'effets indésirables graves en si peu de temps !



Mettons en perspective ces données à partir des [données anglaises de pharmacovigilance](#), car base de données accessibles au public et importance de la population vaccinée.

- 49 554 407 personnes pour la 1ère dose
- 45 460 122 personnes pour la 2ème dose
- 356 154 personnes touchées par un effet indésirable
- **1 740 décès depuis décembre 2020**

UK – YELLOW CARD	20.10 publié le 04.11	25.08 publié le 04.09
Nombre de doses administrées	95 014 529	90 095 045
Nombre de doses nouvelles	4 919 484	12 185 868
Nombre de personnes vaccinées avec 1 dose	49 554 407	47 860 628
Nombre de personnes vaccinées avec 2 doses	45 460 122	42 234 417
Chiffre des effets indésirables	1 252 679	1 178 069
Nombre de personnes touchées par 1 EI	356 154	335 812
Nombre de personnes décédées	1 740	1 612
Taux de mortalité lié au vaccin	0.0035%	0.0034%
Taux de personnes ayant expérimenté 1 EI	0.7187%	0.7016%
Nombre d'avortements spontanés	617	523

LES EFFETS INDÉSIRABLES DE LA VACCINATION COVID-19

FAIT #1 Il n'y a jamais eu un tel déluge d'effets indésirables graves en si peu de temps !



Analyse dans la même base des données de 70 DCI (nom chimique de médicaments), représentant 20% des médicaments les plus utilisés et les plus à risque. Cela inclut les médicaments dits High Alert Medication de l'ISMP. Ces médicaments dangereux occasionnent le plus grand nombre d'accidents mortels et nécessitent des [mesures spécifiques](#) de prévention de la part des professionnels de santé (ex : anticoagulants, héparines, anticancéreux, insulines, opoïdes, électrolytes, anesthésiants).

En 10 mois, les vaccins ont causé 4,1 x plus d'effets indésirables mortels que 70 substances sur 1 an (ces 70 substances représentent 20% des volumes de médicaments utilisés et 428 décès liés à effets indésirables en 2019).

Ces vaccins représentent près de 25% (5 987) du total des décès occasionnés par les 70 substances sur 50 ans de recueil !

- Depuis 1964 861 morts liés aux opoïdes
 17 morts liés à l'hydroxychloroquine
- Depuis 2003 5 morts liés à l'Ivermectine
- Depuis 1999 114 morts liés au Vioxx
 6 décès pour la pilule Yasmin.

Malgré les nombreux effets indésirables graves et les décès, les autorités maintiennent que le ratio bénéfice-risque reste favorable à la vaccination

LES EFFETS INDÉSIRABLES DE LA VACCINATION COVID-19

FAIT #2 Les données publiées sont tronquées, non fiables, et non transparentes.



Il y a une disparité entre les données déclarées au niveau européen et les bases nationales.



Belgique : le site de AFMPS annonce au 21.10.2021 29 644 rapports d'effets indésirables notifiés et seulement 14 645 (49%) transmis au niveau européen sans justification.



Angleterre : la base de données européennes compte au 20.10 2 291 personnes touchées alors que le site anglais annonce 356 154 personnes victimes d'effets indésirables.

AstraZeneca et Pfizer-BioNTech



EU : la qualité des données* est questionable et l'âge a été supprimé des rapports individuels.



Suisse : Swissmedic ne donne pas accès aux données brutes. Au 5 novembre 2021, 9 834 rapports d'effets indésirables ont été évalués, dont 3 396 effets graves, et 155 décès.**

*Les décès sont cachés – il faut extraire chaque vaccin et rechercher “fatal” dans l'extraction des données. Les classes d'âges 18-64 sont peu concluantes.

**Swissmedic ne donne pas accès à la répartition des âges pour les effets indésirables graves et les décès mais juste une moyenne.

A noter que l'accès aux vrais chiffres du nombre de décès occasionnés par ces vaccins dans la base de données européennes est rendu très compliqués. Soit, on calcule le nombre d'effets indésirables ayant entraîné un décès en

les recherchant pour chacune des 27 groupes de réactions mais plusieurs effets indésirables peuvent être imputés à un décès. Soit, on extrait le listing des rapports de toutes les déclarations pour faire des calculs.

LES EFFETS INDÉSIRABLES DE LA VACCINATION COVID-19


FAIT #3 Les risques de la vaccination l'emportent sur les risques de COVID grave.



Les adultes de la tranche 18-50 ans, prennent un risque plus important à se vacciner que de faire un COVID sévère.



A partir des données de l'étude clinique utilisée par les autorités pour octroyer l'Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) conditionnelle du vaccin Moderna, **la tranche 18-64 ans a 0.072% de risque de faire un COVID sévère.**¹



1. Ces données de l'étude clinique ont été comparés aux données de pharmacovigilance française (source ANSM) car c'est la seule agence qui donne des chiffres d'effets indésirables graves par tranche d'âge dans ces rapports.

LES EFFETS INDÉSIRABLES DE LA VACCINATION COVID-19

FAIT #4 Les vaccins sont en essais cliniques phase 3 – résultats prévus en 2022/2023.



Les effets indésirables à moyen/long terme sont méconnus.

Afin d'accélérer le développement des vaccins COVID, les essais cliniques de phases I, II et III ont été lancés en même temps en avril 2020 pour Pfizer-BioNTech, et phases II et III en juillet 2020 pour le vaccin de Moderna.

Les résultats finaux sur les risques et les bénéfices de la vaccination COVID-19 contre la prévention de l'infection et de sa transmission, seront disponibles en **mai 2023*** pour Pfizer-BioNTech et en **octobre 2022** pour Moderna.

Les vaccins COVID ont reçu une **autorisation à durée limitée** de Swissmedic, qui n'est valable que 2 ans.

LES EFFETS INDÉSIRABLES DE LA VACCINATION COVID-19

FAIT #4 Les vaccins sont en essais cliniques phase 3 – résultats prévus en 2022/2023.



Quelques soucis avec les essais cliniques en cours :

- les données brutes ne sont pas publiées ;
- le suivi des groupes avec le “placebo-control” des essais cliniques en cours ne dépasse pas les 6 mois ;
- il n’y eu aucune étude de cancérogénèse ou sur la fertilité. La reprotoxicité n’a été conduite que sur une seule espèce animale contrairement aux recommandations post scandale de la thalidomide ;
- il n’y a pas eu d’étude de toxicité sur les excipients ALC-0159 / ALC-3015 (Pfizer-BioNTech) et SM-102 (Moderna) alors que **ce sont des excipients qui sont totalement nouveaux.**

LES EFFETS INDÉSIRABLES DE LA VACCINATION COVID-19

FAIT #5 Swissmedic estime que 10%
d'effets indésirables des
vaccins sont annoncés !



Swissmedic admet en 2020 que 90% des effets indésirables suite à la vaccination ne sont pas annoncés¹.

Il est connu que la sous-déclaration nette des effets indésirables (EI) est systémique pour tous les vaccins.

En 10 mois, Swissmedic a enregistré plus d'effets indésirables pour le vaccin COVID-19, que pour tous les vaccins cumulés depuis 10 ans ! **9 834 EI de janvier au début novembre 2021 contre 2 246 EI de 2011 à 2020 !**

Malgré la nature expérimental de cette injection, la charge de la preuve lien-causalité incombe à la victime.

Pour ajouter l'insulte à la blessure, les fabricants et les autorités (OFSP et Swissmedic) n'ont aucune responsabilité pour les dommages causés. Rappelez-vous que c'est un vaccin hors définition standard, utilisant une nouvelle biotechnologie à l'ARNm, jamais utilisée auparavant sur la population.

1. https://www.swissmedic.ch/dam/swissmedic/fr/dokumente/stab/networking/ereignisprotokoll_22_09_2020.pdf.download.pdf/200922_Ergebnisprotokoll_FR.pdf

LES EFFETS INDÉSIRABLES DE LA VACCINATION COVID-19

FAIT #6 Le COVID-19 est une maladie à faible mortalité



Selon les statistiques* de www.covid19.admin.ch


Âge	Risque de mort**	Taux de survie
0-9	0.042 %	99.958 %
10-19	0.00 %	100 %
20-29	0.004 %	99.996 %
30-39	0.01 %	99.99 %
40-49	0.03 %	99.97 %
50-59	0.16 %	99.84 %
60-69	1.03 %	98.97 %
70-79	5.21 %	94.79 %
80+	16.12 %	83.88 %

* Période: 24.02.2020-05.01.2021

** Case-fatality rate

Repartition des décès COVID selon les tranches d'âges

● Age 80+	● 70-79	● 60-69
72.16 %	19.94 %	5.9 %
● 50-59	● 40-49	● 0-39
1.58 %	0.25 %	0.16 %



LES EFFETS INDÉSIRABLES DE LA VACCINATION COVID-19

FAIT #7 La fréquence des nombreux effets indésirables observés par Pfizer-BioNTech.



Classification de la fréquence	Pour 1'000'000 personnes vaccinées, les blessures probables	COMIRNATY® PFIZER-BIONTECH dès 12 ans
Très fréquent ≥1/10 ≥ 10 %	≥ 100,000	Maux de tête, fatigue, fièvre, frissons, douleurs et gonflement au point d'injection, myalgie ¹ , arthralgie ²
Fréquent ≥1/100 à <1/10 1-10 %	10,000 à 100,000	Pathologies gastro-intestinales, nausées, rougeurs au point d'injection <i>et au-delà</i> ?
Infréquent ≥1/1,000 à <1/100 0.1-1 %	1,000 à 10,000	Lymphadénopathie, insomnie, malaises, douleurs aux extrémités, prurit ³ au point d'injection <i>et au-delà</i> ?
Rare ≥1/10,000 à <1/1,000 0.01-0.1 %	100 à 1,000	Paralysie faciale périphérique aiguë, myocardite, <i>perte de vision et d'audition</i> ?
Très rare <1/10,000 < 0.01 %	< 100	Thromboses, troubles neurologiques, <i>respiratoires et cardiovasculaires</i> ?
Inconnu <1/100,000 ?	< 10	Anaphylaxie, hypersensibilité, <i>décès ? stérilité</i> ?

Les effets adverses sont observés depuis quelques mois, et touchent plus les femmes !

¹ Myalgie est le terme médical pour la douleur musculaire.

² Arthralgie est un terme utilisé pour décrire des douleurs dans une ou plusieurs articulations du corps.

³ Le prurit est le terme médical désignant la sensation de démangeaisons de la peau, et qui conduit à se gratter.